

Allgemeine Hinweise zur Untersuchung

Die Untersuchung wird mit Buscopan durchgeführt. Dies kann zu kurzfristigen Einschränkungen der Fahrtauglichkeit führen. Bei nicht eingestelltem erhöhtem Augeninnendruck, Prostatahyperplasie oder Herzrhythmusstörungen kann möglicherweise kein Buscopan verabreicht werden.

Bitte Informieren Sie uns über das Vorliegen solcher Leiden.

Zur Darmkontrastierung trinken Sie in unserer Praxis eine spezielle Lösung (Mannitol) über den Zeitraum von 1 - 1,5 h vor der Untersuchung.

Es wird ein aktueller Serum-Kreatinin-Wert/GFR benötigt, da ein intravenöse Kontrastmittelgabe während der Untersuchung erfolgt.

Darmvorbereitung

Am Vortag der Untersuchung sollen keine festen Nahrungsmitteln zugeführt werden. Flüssige Nahrungsmittel z.B. Suppen ohne Einlagen und Getränke sind erlaubt. Die orale hausärztliche Medikation soll fortgeführt werden.

Am Morgen des Untersuchungstages ist der Darm mittels Microlax (dies muss sich der Patient aus der Apotheke besorgen) zu reinigen.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Weiter Infos erhalten Sie auf unserer Homepage www.boos-moog.de